

Tritó pirinenc

(*Calotriton asper*)



Gairebé
amenaçat

Tritó del Montseny

(*Calotriton arnoldi*)



Criticament
en perill
d'extinció

C. asper té una coloració dorsal variable on predominen tons ocracis i grisosos podent presentar una línia vertebral, ventralment acostumen a presentar una franja central de tons vermells, ataronjats o groguencs.



Línia vertebral groga
sobretot en juvenils.

C. arnoldi presenta el dors color xocolata podent tenir iridescències daurades (poblacions occidentals) o taques grogues (poblacions orientals), compta amb una taca blanquinosa a la gola i el ventre de color crema amb puntejat fosc.



Amb protuberàncies còrnies al tronc i punta dels dits. Cua comprimida lateralment. Sense crestes ni membranes entre els dits.

ADULTS

MIDA: entre els 9-12 cm de longitud cap-cua.

HÀBITAT: espècies pròpies de mitja i alta muntanya (entre els 700 i els 2.550 m d'alçada) on habiten torrents d'aigües amb corrents fredes, ben oxigenades i pedregoses. *C. asper* també es pot trobar en estanys d'alta muntanya i cursos d'aigua subterranis.

COMPORTAMENT: ambdós de vida aquàtica tot i que *C. asper* pot sortir al terra. Majoritàriament nocturn, però no és difícil trobar-lo de dia.

LARVA

MIDA: mitjana, d'uns 6 cm de llargada total normalment.

HÀBITAT: igual al dels adults, però prefereixen amagar-se entre les fissures i escletxes.

COMPORTAMENT: més discret que els adults. Es troba al substrat i confia en la seva coloració per passar despercebudes.

Cresta dorsal poc desenvolupada, comença a la part posterior del tronc.




Cap lleugerament allargat.

Cua musculada, amb l'extrem arrodonit i aleta caudal poc més ample que el cos.

POSTA

Entre 15 i 50 ous col·locats per separat sota pedres submergides.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Larves
Gener	●	
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	
Setembre	●	
Octubre	●	
Novembre	●	
Desembre	●	

Amb el suport de:

